



INFORME TECNICO

ACTUALIZACION INTEGRAL DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 2011

ANEXO N. 3

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION

EDAD	VACUNA		DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Recién nacido	Antituberculosa - BCG		Única	Meningitis tuberculosa
	Hepatitis B		De recién nacido	Hepatitis B
A partir de los 2 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Primera	Difteria - tos ferina - tétanos
		<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Vacuna oral de rotavirus			Diarrea por rotavirus
	Vacuna oral de polio - VOP			Poliomielitis
A partir de los 4 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Segunda	Difteria - tos ferina - tétanos
		<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Vacuna oral de rotavirus			Diarrea por rotavirus
	Vacuna oral de polio - VOP			Poliomielitis
A partir de los 6 meses	PENTAVALENTE*	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)	Tercera	Difteria - tos ferina - tétanos
		<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b		Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
		Hepatitis B		Hepatitis B
	Vacuna oral de polio - VOP			Poliomielitis
De 6 meses a 23 meses	Vacuna de influenza		Primera Segunda a las cuatro semanas de la primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza
A los 12 meses	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)		Unica	Sarampión, rubéola y paperas
	Fiebre amarilla (FA)		Unica	Fiebre amarilla
Al año de las terceras dosis	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)		Primer refuerzo	Difteria, tos ferina y tétanos
	Vacuna oral de polio - VOP		Primer refuerzo	Poliomielitis
A los 5 años de edad	Difteria - tos ferina - tétanos (DPT)		Segundo refuerzo	Difteria - tos ferina - tétanos
	Vacuna oral de polio - VOP		Segundo refuerzo	Poliomielitis
	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)		Refuerzo	Sarampión, rubéola y paperas
Mujeres en edad fértil (MEF) Entre los 10 y 49 años**	Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)		MEF** 5 dosis Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td1 Td4: al año de la Td3 Td5: al año de la Td4 Si la MEF tiene antecedente de 5 dosis de DPT (tres de esquema y dos refuerzos) aplicar un refuerzo cada 10 años después de la 5 dosis (15, 25, 35 y 45)	Difteria, tétanos y tétanos neonatal
20 años después de la primera dosis***	Fiebre amarilla (FA)		Refuerzo cada 20 años	Fiebre amarilla en zonas endémicas
2 a 11 meses	Streptococo Neumonie****	2 meses: Primera dosis 4 meses: segunda dosis Al año de edad tercera dosis		Neumonías y Meningitis por Neumococo
12 a 23 meses		Dos dosis con intervalo de 8 semanas		
24 a 35 meses		Unica		

* PENTAVALENTE: antígenos en presentación polivalente para menores de 1 año.

** MEF Mujeres en edad fértil

*** En población de riesgo y según planes de contingencia vigentes.

**** Para niños con patologías especiales, bajo peso al nacer (menor o igual a 2500 g.) y 10 departamentos.